

Bismutbasierte Behandlung von Helicobacter pylori

Bei Ihnen wurde eine Infektion der Magenschleimhaut durch *Helicobacter pylori* diagnostiziert. Daher soll jetzt die Behandlung mit einem Kombinationspräparat eingesetzt werden, das Bismut, Metronidazol und Tetracyclin enthält (Pylera®).

Die Erfolgsaussichten der Behandlung sind größer, wenn die Medikamente regelmäßig und vollständig eingenommen werden und wenn während der Dauer der Behandlung nicht geraucht wird. Während und am Tag nach der Behandlung dürfen keine alkoholischen Getränke konsumiert werden.

Gegenanzeigen sind Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, bekannte Allergie gegen Bismut, Metronidazol oder Tetracycline; Schwangerschaft und Stillzeit. Für Kinder zwischen bis zum 18. Lebensjahr wird die Medikation nicht empfohlen. Lesen Sie hierzu auch die Packungsbeilage.

Sicherheitsprofil und Verträglichkeit der Therapie sind gut, am häufigsten wurden Durchfälle, Appetitlosigkeit und Schwarzfärbung des Stuhlgangs beobachtet.

Durchführung: zehn Tage lang

nach dem Frühstück 1Tabl. Omeprazol 20mg + 3 Kapseln Pylera®

nach dem Mittagessen 3 Kapseln Pylera®

nach dem Abendessen 1Tabl. Omeprazol 20mg + 3 Kapseln Pylera®

vor dem Schlafengehen 3 Kapseln Pylera®

Eine Erfolgskontrolle sollte frühestens acht Wochen nach Ende der Behandlung durchgeführt werden, um eine sichere Aussage des Tests zu ermöglichen. Wir bitten Sie, dafür eine Stuhlprobe einzureichen, die wir dann auf *Helicobacter* testen können. Bitte pausieren sie den Magensäureblocker eine Woche vor der Gewinnung der Stuhlprobe, da die Einnahme der Präparate (Pantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Rabeprazol) das Testergebnis verfälschen kann.